

Boyacá es un departamento desnutrido

A propósito de la desnutrición que ha develado la situación actual en La Guajira, el portal razonpublica.com analiza la desnutrición en Colombia, donde Boyacá ocupa un preocupante tercer lugar

Entre 2005 y 2010 la desnutrición crónica en niños menores de cinco, aumentó un 2,10 % en el área urbana y disminuyó un 0,10 % en el área rural. La desnutrición crónica es un 5,4 % más común en el área rural, que en el área urbana (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 2010).

Según el seguimiento realizado por la Contraloría General de Boyacá, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2011, en el ítem de nutrición en niñas y niños menores de cinco años, Boyacá tiene las condiciones necesarias para que ninguno de sus habitantes sufra de hambre o desnutrición, no obstante existe población que aún padece de este flagelo y que en muchos casos, corresponde a población vulnerable por su edad y condición, como son los niños y niñas menores de cinco años, escolares, mujeres gestantes y adultos mayores, lo que hace que esta situación sea inaceptable, y sea por tanto prioridad en los Planes de Gobierno.

Lo preocupante es que en las dos encuestas nacionales de la situación nutricional en Colombia (ENSIN) de 2005 y 2010, Boyacá ha ocupado el segundo y tercer lugar respectivamente, reflejando entonces un mal manejo de esta problemática que aqueja a dicha población.

La cifra en 2005 fue de 23.3 %, que dobló la del nivel nacional que correspondía al 12 %; para este mismo año el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional de Boyacá (SISVAN), reportó cifras de desnutrición crónica del 18,1 %, de desnutrición aguda del 5.5 %, siendo cuatro veces mayor que la del nivel nacional de 1,3 %; y la desnutrición global que se presentó en 12.3 %, la cual fue 1.7 veces mayor que la del nivel nacional, de 7 %.

Pues bien. En la ENSIN de 2010, Boyacá sigue arrojando resultados negativos, donde alcanzó el 30,9 %, superado por Vaupés y Guajira. En el informe de la Contraloría de 2011, los municipios que presentaban alta prevalencia de desnutrición para 2009, como es el caso para el retraso en talla o desnutrición crónica, se presentaron los mayores índices en Úmbita, La Capilla, Tópaga, Boyacá, Ventaquemada, Busbanzá y Santa María; en cuanto al retraso en peso o desnutrición global, su mayor prevalencia se presentó en Busbanzá, La Capilla, Úmbita, Santa María, Campohermoso, Gachantiva, Tutazá, Boyacá, Ventaquemada, Tópaga y Sotaquirá, y para el retraso de peso para la talla o desnutrición aguda, Chivor, Campohermoso, Mongua y Ráquira registraron mayor prevalencia.

Según el análisis de la situación de salud del país en 2013, del Ministerio de Salud, la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años entre 2005 y 2011, para Boyacá fue del 0.03 por cada 100 mil menores, teniendo una confianza del



/Foto: Archivo EL DIARIO

Mientras que en La Guajira la sequía y la desnutrición se hacen evidentes, cifras de estudios anteriores revelan que la situación en Boyacá tampoco es favorable en tema de nutrición de los infantes menores de cinco años

Comparación de desnutrición crónica en Boyacá, en niños de 0 a 4 años ENSIN 2005 - 2010

Retraso en talla (<-2 de)					
2005			2010		
%	IC*		%	IC*	
30.9	24.2	37.7	16.7	12.5	22.0

95 %. Así mismo, la desnutrición crónica en niños menores de cinco años en el departamento, fue de 16.70.

Un estudio de la Universidad Externado de Colombia de 2006, presagió de alguna manera lo que está pasando actualmente en La Guajira y por supuesto, el panorama de desnutrición en Boyacá. Para ese año, se concluyó que la mortalidad por desnutrición era más elevada en zonas donde se adelantaban "proyectos de alta productividad agroindustrial, minera y petrolera, en los territorios donde hacen presencia resguardos indígenas y en los municipios medios que tienen entre 50 y 100 mil habitantes que son hoy por hoy escenario de grandes proyectos de producción de agro-combustibles". Tales son los casos de Bolívar y Atlántico, que concentran cerca del 8 por ciento de las muertes, seguidos de Amazonía, Boyacá, la Guajira, Chocó y Magdalena. Para finalizar, en dicho estudio, tres municipios boyacenses registraron la probabilidad de muerte por desnutrición,

superando las 1.000 muertes por cada 100 mil nacidos vivos: Quipama (1.038,96), Cubará (1.201,92) y Pisba (1.515,15).

Distinguir los tipos de hambre importa en tanto cada uno tiene secuelas distintas. Sin embargo, todos tienen la pobreza y la injusticia como sus causas básicas.

La desnutrición aguda, retraso del peso para la talla, corresponde al "hambre aguda"; la desnutrición crónica, retraso de la talla para la edad, corresponde al "hambre crónica"; y en Colombia, además, hay graves carencias de micronutrientes como hierro, zinc, calcio y vitamina A, un problema denominado "hambre oculta".

Aunque ninguna de las tres modalidades de desnutrición debería existir en un país con el nivel de ingreso de Colombia, es indudable que la situación ha tendido a mejorar durante la últimas dos décadas, según indican las dos encuestas de 2010 – la de Demografía y Salud (ENDS) y ENSIN.

Periódico de opinión de Boyacá • Autonomía y análisis

www.periodicoeldiario.com

f /periodicoeldiario

t /ELDIARIO

2014

MEDIO AMBIENTE
TECNOLOGÍA
SALUD
MUNICIPIOS
ACADEMIA VIDA SOCIEDAD
ECONOMÍA
OPINIÓN
CULTURA
POLÍTICA
DEPARTAMENTO
COLUMNISTAS
2014
DEPORTES